

Jaro a podzim jsou období, kdy dochází k migraci volně žijících ptáků, zvláště pak vodních. V tomto období existuje zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Proto je nutné zajistit, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování preventivních opatření v chovech.

PTAČÍ CHŘIPKA - OPATŘENÍ V DROBNOCHOVECH

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V DROBNOCHOVECH




1. Držte drůbež v uzavřených objektech
Krmivo a vodu podávejte v uzavřeném přístřešku.



2. Zabraňte přístupu volně žijících ptáků, hlodavců i jiných zvířat do chovu (plachty, sítě)



3. Dodržujte osobní hygienu, převlékání, přezouvání, mytí rukou při vstupu ze dvora do domu



4. Sledujte zdravotní stav drůbeže : zvýšené hynutí, netečnost, průjem, otoky okolo očí a hřebínku, těžké dýchání mohou být u drůbeže příznaky chřipky



5. Zvýšené úhyny drůbeže nahlase svému veterinárnímu lékaři nebo veterinární správě na dole uvedená čísla



6. S podezřelou a uhynulou drůbeží (ptáky) manipulujte opatrně pouze s použitím ochranných prostředků (rukavice, gumové holínky)